

Листовка: информация за потребителя

Миртол 120 mg стомашно-устойчиви капсули, меки

Дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон (66:32:1:1)

Myrtol® 120 mg gastro-resistant capsules, soft

Distillate of a mixture of rectified essential oils of eucalyptus, sweet orange, myrtle and lemon (66:32:1:1)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Миртол и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Миртол
3. Как да приемате Миртол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Миртол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20020340
Разрешение №	BG/MK/MK-72379
Одобрение №	16-08-2011

1. Какво представлява Миртол и за какво се използва

Миртол са стомашно-устойчиви капсули, меки

Миртол се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синусити.

Миртол повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на дихателните пътища, втечнява сгъстения секрет, засилва отделянето му, улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Миртол

Не приемайте Миртол

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или някоя от останалите съставки на Миртол



Други лекарства и Миртол

Няма известни взаимодействия с други лекарства.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, дори такива, които се отпускат без лекарско предписание

Миртол с храна и напитки

Капсулите Миртол се приемат $\frac{1}{2}$ час преди хранене с голямо количество хладна течност.

Специални предупреждения

Ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар.

Бременност, кърмене и фертилитет

Въпреки че липват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото тримесечие, Миртол може да се прилага само след консултация с лекар.

Възможно е преминаване на Миртол в майчиното мляко поради липофилни свойства.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Миртол няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Миртол съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Миртол

Ако не е предписано друго, да се спазват следните указания:

Възрастни и деца над 10 години приемат при остри възпаления по 2 капсули 4-5 пъти дневно; при хронични заболявания се приемат по 2 капсули 3 пъти дневно, като тази дозировка се препоръчва и за поддържаща терапия.

За да се улесни експекторацията сутрин, в случай на хроничен бронхит, се приема по 2 капсули Миртол допълнително вечер преди лягане.

Деца от 4 до 10 години приемат 1 капсула Миртол 4-5 пъти дневно при остри заболявания и по 1 капсула 3 пъти дневно при хронични.

За по-добър сън последната доза да се приема преди лягане.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението с Миртол зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможно приемане на медикамента продължително време.



Ако сте приели повече от необходимата доза Миртол?

Ако сте приели по-голямо количество Миртол следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло перорално, промивка на стомаха с 5 % разтвор на натриев бикарбонат, поставяне на кислородна маска.

Ако сте пропуснали да приемете Миртол

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Миртол може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В единични случаи могат да се появят оплаквания в стомашно-чревната област, като подуване, болка, гадене, диария, както и да настъпи раздвижване на намиращи се в жлъчката и бъбреците камъни.

В отделни случаи се наблюдават алергични реакции /напр. обриви по кожата, отоци по лицето, задух или нарушения в кръвообръщението/.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Миртол?

Да се съхранява под 25 °С!

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

6. Допълнителна информация



Какво съдържа Миртол

Една стомашно-устойчива капсула, мека Миртол съдържа:

- Активно вещество: 120 mg дестилат от смес от пречистени етерични масла от евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон
- Помощни вещества: Триглицериди, средно-верижни, желатин, глицерол, сорбитол, течен (некристализиращ), солна киселина (13%), хипромелоза ацетат сукцинат, триетил цитрат, натриев лаурил сулфат, талк, декстрин, амониев глициризат

Как изглежда Миртол и какво съдържа опаковка

Стомашно-устойчиви капсули, меки по 20 броя в опаковка

Притежател на разрешението за употреба и производител:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt

Германия

Дата на последна редакция на листовката

Юни 2018

