

Листовка за пациента



Validol
Валидол

Качествен и количествен състав

1 таблетка съдържа активно вещество Menthyl valerate 60 mg
Помощни вещества-захароза 1.158 g, калциев стеарат 0.005 g.

Опаковка
20 таблетки

Притежател на разрешението за употреба
Открито акционерно общество "Фармак" (ОАО "Фармак")
ул. "Фрунзе" №63, Киев 080, Украйна

Действие - съдоразширяващо и седативно

Показания

Болки в сърдечната област, помощно средство при краткотрайни пристъпи на стенокардия при исхемична болест на сърцето, неврози, хистерия, пристъпи на "морска болест", или "въздушна болест". Ефективен е при леко гадене с неврогенен произход.

Противопоказания

Много рядко - свръхчувствителност към активното вещество или помощните съставки.

Бременност и кърмене
Няма противопоказания

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини
Няма

Дозировка и начин на приложение

При възрастни: прилага се сублингвално 1 таблетка до пълното и разтваряне. Честотата на прием и продължителността на лечение се определят в зависимост от терапевтичния ефект.
При деца над 6 годишна възраст: прилага се 1/2 от дозата при възрастни.

Предозиране
Няма данни за предозиране.

Нежелани реакции

При продължителен прием може да се появят леко гадене, слъзотечение, световъртеж, които бързо отзвучават от само себе си.
Възможни са прояви на свръхчувствителност.



Условия на съхранение

Съхранява се под 25° С, на сухо място.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Отпуска се без лекарско предписание.

Срок на годност

2 години

Дата на последна редакция

16.01.2002 г.

